

УДК 617.735-007.281

doi: 10.25276/2949-4494-2023-2-22-23

## Трансклеральная фиксация ИОЛ у пациента с регматогенной отслойкой сетчатки и афакией

Г.О. Карпов, Р.Р. Файзрахманов, А.О. Мартынов

*Национальный медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва*

### Transscleral fixation of IOL in a patient with regmatogenic retinal detachment in aphakia

G.O. Karpov, R.R. Fayzrakhmanov, A.O. Martynov

*N.I. Pirogov National Medical Surgical Center, Moscow, Russian Federation*

**Цель.** Представить вариант трансклеральной фиксации интраокулярной линзы (ИОЛ) у пациента с регматогенной отслойкой сетчатки и афакией. **Методы.** Пациент Ш., 42 лет, поступил в НМХЦ им. акад. Н.И. Пирогова с жалобой на низкое зрение правого глаза. В анамнезе факто-эмульсификация катаракты без имплантации ИОЛ правого глаза в связи с перенесенной тупой травмой. До операции: Vis OD 0,01, Vis OS 1,0; внутриглазное давление (ВГД) OD = 17 мм рт.ст., ВГД OS = 15 мм рт.ст. Поступил с диагнозом: регматогенная отслойка сетчатки, афакия правого глаза. Была выполнена трансклеральная фиксация ИОЛ, трехпортовая витрэктомия 25G + эндолазеркоагуляция + эндотампонада C2F6. **Результаты.** Послеоперационный период проходил без осложнений. Через 1 месяц: Vis OD = 0,5; ВГД = 16 мм рт.ст. **Выводы.** Трансклеральная фиксация ИОЛ у пациента с регматогенной отслойкой сетчатки и афакией является оптимальным вариантом хирургического лечения.

**Ключевые слова:** регматогенная отслойка сетчатки, интраокулярная линза, трансклеральная фиксация ■

**Для цитирования:** Карпов Г.О., Файзрахманов Р.Р., Мартынов А.О. Трансклеральная фиксация ИОЛ у пациента с регматогенной отслойкой сетчатки и афакией. Клинические случаи в офтальмологии. 2023;2: 23. doi: 10.25276/2949-4494-2023-2-22-23

**Автор, ответственный за переписку:** Григорий Олегович Карпов, karpov\_go@mail.ru

Статья сопровождается видеоматериалом